PRECAUCIONES:
MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Conservar en el envase original cerrado, lejos del fuego, de los alimentos y fuera del alcance de los niños. Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. Usar guantes de goma, careta, antiparras, sombrero y ropa protectora adecuada durante su preparación y aplicación. Después de usarlo lavarse bien con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No beber, comer o fumar durante los tratamientos. No es conveniente recorrer sin protección adecuada los cultivos tratados con este insecticida, hasta que no hayan transcurrido como mínimo 24 horas desde su aplicación. Lavar la ropa de trabajo antes de volver a usarla.

RIESGOS *AMBIENTALES:*
ABEJAS: Altamente tóxico. Evitar el uso en el período de actividad de estos insectos. Cuando sea necesario aplicar este producto en ese período, es conveniente trasladar las colmenas a una distancia de por lo menos 4 km por un lapso de 7 días, pulverizando temprano por la mañana o al atardecer. Cuando esto no sea posible, se conseja tapar con arpillera húmeda las piqueras 2 horas antes de la aplicación y abrirlas luego de efectuada y oreada la misma.
AVES: Muy tóxico. No debe aplicarse en áreas donde se encuentren aves alimentandose activamente o en reproducción. No realizar aplicaciones aéreas sobre o en zonas dercanas a dormideros, bosques, parques protegidos, reservas faunísticas. No aplicar en áreas donde se conozca la existencia de aves protegidas.
PECES: Ligeramente tóxico. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existiera agua libre en superficie, dejando una franja de seguridad de no menos de 50 metros. No contaminar fuentes de agua cuando se elimina la misma por medio de la limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra.

TRATAMIENTO DE REMANENTES: En caso de que hubiera algún remanente, puede usarse en próximas aplicaciones si hubiere breves períodos de tiempo entre una aplicación otra. Si no fuera posible, utilizar el remanente aplicando el mismo sobre alambrados y/o caminos en una mayor dilución. Los restos del caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos y envases no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.) Todos los desechos, restos y envases vacíos deben ser reunidos para su destrucción, de modo tal que ofrezcan la máxima garantía para la salud humana y el ambiente.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Verificar que estén vacíos. Aplicar la técnica del triple lavado. Llenar el envase vacío con agua limpia, con una cuarta parte de su volumen total. Ajustar la tapa y agitar enérgicamente. Agregar al tanque de la pulverizadora el agua proveniente de esta limpieza. Repetir esta operación por lo menos dos veces más. Inutilizar los envases vacíos perforándolos, evitando dañar la etiqueta. Colocar en tambores o contenedores y enviar a una planta de tratamiento para su disposición final, según la legislación nacional y local vigente.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugar seco, fresco, bien ventilado, fuera de los rayos solares y de los lugares que pudieran sufrir temperaturas menores a 0 grado centígrado, apartado de semillas, fertilizantes, otros funguicidas, insecticidas y utensilios para manejar estos a fin de evira contaminaciones y/o inconvenientes al producto. Debe evitarse que contamine agua de riego o de consumo. Los envases deben ser conservados con sus tapas invioladas.

DERRAMES: Recoger el producto derramado, agregarle material absorbente (tierra, aserrín, turba, aglutinante para químicos). Luego se lo debe introducir en un recipiente, cerrarlo y proceder a su envío a una planta de tratamiento habilitada para su disposición final.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, dar a beber agua, sin provocar el vómito y llamar al médico. En caso de contacto con los ojos o piel, lavar con abundante agua limpia y llamar al médico.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:
CLASE II - PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO.
Mínimo irritante ocular. No irritante dermal. No sensibilizante dermal.
Utilizar antiparras y guantes de goma durante el manejo del producto.

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Irritación leve de piel y mucosas. Dermatitis. Trastornos del sistema nerviosos central, con disminución de la temperatura corporal y de la presión sanguínea. Estado de excitación y síntomas de parálisis ascendente.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION: U**nidad Toxicológica del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez",** Tel.: (011) 4962-2247 y 4962-6666. **Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico "Prof. A. Posadas",** Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777. **Hospital de Clínicas "José de San Martín",** Tel.: (011) 5950-8804 / 06. **Centro Toxicológico TAS,** Tel.: 0800-888 TOXICO (8694) / Tel: (0341) 4480077 / 4242727.- Tucumán 1544 - Rosario. **Línea Gratuita: 0800-333-0160.**

INSECTICIDA

AZOTE

SUSPENSION CONCENTRADA

COMPOSICION

imidacloprid: 1-(6 cloro - 3 - piridilmetil) - N - nitroimidazolidin - 2 ilideneamida ..... 35 g

inertes y agua ... c.s.p. ..... 100 ml

"LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO"

SENASA N° **35.898**

N° de Lote: Fecha de vencimiento: / /

Industria ARGENTINA Contenido neto litro/s

PRODUCTO NO INFLAMABLE

Registrado por:

FORMULAGRO S.R.L.

Ruta Provincial N° 10 S/N
Tel. (03476) 426531 / 426532 - Telefax: (03476) 423878
(2200) San Lorenzo - Pcia. de Santa Fe
Acceso Norte a San Lorenzo por Autopista

NOCIVO

GENERALIDADES: El IMIDACLOPRID es un insecticida que actúa por ingestión y contacto. La acción se basa en una intervención en la transmisión de los estímulos en el sistema nervioso de los insectos. De manera análoga a cómo actúa la acetilcolina que es un transmisor químico natural de impulsos nerviosos, el Imidacloprid excita ciertas células nerviosas, atacando una proteína receptora. El efecto prolongado del producto transforma el sistema nervioso de los insectos, ocasionándoles finalmente la muerte.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: PREPARACION: Llenar el tanque del equipo de aplicación hasta la mitad de su capacidad, agregar la dosis indicada y completar la capacidad total del equipo con agua. En todo momento se debe mantener los agitadores en movimiento.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN: Aplicación en riego por goteo: agregar a la bomba dosificadora del equipo la cantidad de producto indicada por hectárea y aplicar en conjunto con la operación de riego. Lograr una buena cobertura del producto sobre el cultivo a tratar con 20-30 gotas cm2 de follaje. **Aplicación con mochila:** incorporar la dosis por hectárea de acuerdo a la cantidad de mochilas necesarias calculadas para cubrir dicha unidad de superficie. **Aplicación foliar:** incorporar la dosis indicada por cada 100 litros de agua, de acuerdo a la capacidad del equipo de aplicación. Lograr una buena cobertura del producto sobre el cultivo a tratar con 20-30 gotas cm2 de follaje. El caudal de aplicación varía de acuerdo al tipo de producción.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS PC 35 %	MOMENTO DE APLICACION
ALCAUCIL	Pulgón verde del alcaucil (Capitophorus eleagni)	30 a 50 cm3 / hl (AF)	*
BERENJENA	Minador de la hoja (Liriomyza spp.) Trips (Frankliniella spp.)	1 - 1,5 l/ha (RG) 35 - 60 cm3/10 lts de agua (PP)	
BERENJENA PEPINO	Mosca blanca (Trialeurodes sp.), Mosca blanca (Aleurothrixus spp.), Mosca blanca (Bemisia sp.)	1,5 - 2 l/ha (RG) 35 - 60 cm3/10 lts de agua (PP)	
CEREZO	Pulgón del cerezo (Myzus cerasi)	30 a 50 cm3 / hl + 0,2 de coadyuvante	Iniciar los tratamientos al observar los primeros ataques de la plaga.
CIRUELO	Pulgón del ciruelo (Brachycaudus helicrisi)		
DURAZNERO	Pulgón verde del duraznero (Myzus persicae)		
CLAVEL CRISANTEMO GLADIOLO PLANTAS ORNAMENTALES ROSAL	Cochinillas (Unaspis spp., Pinnaspis spp., Pseudococcus spp.), Minador de la hoja (Liriomyza spp.), Mosca blanca (Trialeurodes sp., Aleurothrixus spp., Bemisia sp.), Pulgón del rosal (Macrosiphum rosae), Pulgones (Aphis spp., Myzus persicae), Trips (Frankliniella spp.).	1,5 - 2 l/ha (RG) 35 - 60 cm3/10 lts de agua (PP) 35 - 50 cm3/hl (AF)	
LECHUGA	Minador de la hoja (Liriomyza spp.), Trips (Frankliniella spp.)	1 - 1,5 l/ha (RG)	*
	Pulgón de la lechuga (Hyperomyzus lactucae)	1 - 1,5 l/ha (RG) 30 - 50 cm3/hl (AF)	
LIMON NARANJO POMELO	Minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella)	ver momento de aplicación	Aplicar al aparecer la plaga (***) 2 a 3 cm3 por planta menos a 5 años de edad (25 cm3 de solución por plantín) (RG). 750 - 1500 cm3/ha en plantas de 2 a 5 años (RG). 2 a 3 cm3 por planta menos de 5 años de edad (25 cm3 de solución por plantín) (PP). 50 - 100 cm3/hl (5 lts de solución por planta y por metro de altura) (PP). 35 - 50 cm3/hl + 500 cm3 de coadyuvante (AF)
PAPA	Bicho torito o Bicho candado (Diloboderus abderus), Gorgojo del tomate (Phyrdenus nicotianae), Gusanos alambre (Agriotes spp.), Gusanos blancos (Cyclocephala signaticolis), Gusanos blancos (Maecolaspis bridarolli)	1000 cm3/ha (al suelo)	*
	Pulgón verde de la papa (Macrosiphum euphorbiae) Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (Myzus persicae)	1000 cm3/ha (al suelo) 250 cm3/ha (AF)	
PEPINO	Minador de la hoja (Liriomyza spp.) Trips (Frankliniella spp.)	1,5 - 2 l/ha (RG) 35 - 60 cm3/10 lts de agua (PP)	
PIMIENTO	Mosca blanca (Trialeurodes sp., Aleurothrixus spp., Bemisia sp.)	1 - 2 l/ha (RG) 35 - 60 cm3/10 lts de agua (PP) 30 - 50 cm3/hl (AF)	**
	Pulgón verde de la papa (Macrosiphum euphorbiae), Pulgón verde del duraznero, Pulgón rojo (Myzus persicae)		
REPOLLO	Pulgón del repollo (Brevicoryne brassicae)	30 - 50 cm3 / hl (AF)	*
TABACO	Gusano minador del tallo (Faustinus cubae) Pulgón rojo del tabaco (Myzus nicotianae)	500 cm3 / hl (Inmersión)	Sumergir los plantines 1 minuto, dejar escurrir, orear y posteriormente plantarlos. La dilución debe reponerse siguiendo la proporción de 70 cm3 en 10 litros de agua a medida que sea necesario.
TOMATE	Minador de la hoja (Liriomyza spp.), Trips (Frankliniella spp.)	1,5 - 2 l/ha (RG) 35 - 60 cm3/10 lts de agua (PP) 30 - 50 cm3/hl (AF)	*
	Mosca blanca (Trialeurodes sp., Aleurothrixus spp., Bemisia sp.)	1 - 1,5 l/ha (RG) 35 - 60 cm3/10 lts de agua (PP) 30 - 50 cm3/hl (AF)	*

(*) Forma de aplicación: Riego por goteo: simultáneamente con el riego Aplicación al suelo: aplicar conjuntamente con la operación de siembra, de manera tal de ubicar al producto en la línea de siembra. Planta por planta: aplicar la mochila 15 cm3 de solución por cada planta utilizando las dosis menores con altas densidades de plantación. Aspersión foliar: aplicar utilizando los equipos convencionales de pulverización cuando se observen los primeros ataques de la plaga. (**) Forma de aplicación: Riego por goteo: dos aplicaciones, la primera al trasplante y la segunda 45 a 70 días después. Planta por planta: Una aplicación para el caso de mosca blanca después del trasplante y dos aplicaciones para el caso de trips, la primera después del trasplante y la segunda espaciada 60 a 65 días de la primera. (***) Forma de aplicación: Riego por goteo: Simultáneamente con el riego. Las menores o mayores dosis, serán utilizadas según edad y/o tamaño de la planta. Planta por planta: la aplicación debe ser realizada de acuerdo a edad y tamaño de la planta, mojando bien la base del tronco y su área circundante gastando 5 litros de la solución por metro de la planta. Aspersión foliar: aplicar utilizando los equipos convencionales de pulverización cuando se observen los primeros ataques de la plaga.

RESTRICCIONES DE USO: Entre la última aplicación y la cosecha deberá transcurrir el siguiente lapso: Alcaucil, Berenjena, Pepino, Tomate y Pimiento: 3 días. Cerezo, Ciruelo, Duraznero, Clavel, Crisantemo, Gladiolo, Plantas Ornamentales, Rosales : 14 días. Lechuga, Limón, Naranja, Pomelo, Tabaco, Repollo: 7 días. Papa: 21 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
COMPATIBILIDAD: Es compatible con funguicidas e insecticidas neutros. No realizar mezclas con productos de reacción fuertemente alcalina.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y en los cultivos indicados.
AVISO DE CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.
NOTA: Este producto es elaborado cuidadosamente según rigurosas normas de calidad. Siendo su aplicación efectuada sin la intervención de la Empresa en condiciones ambientales y con medios varialbles NO se asume ninguna responsabilidad por el uso y empleo del producto, distinto a los indicados en éste marbete.